

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP -5-3-68 756502

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE" Arras - Tél. 21.04.21

ABONNEMENT ANNUEL

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE - SEINE-MARITIME)

25 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Alerte Agricoles d'ARRAS  
C. C. P. - LILLE 57-01-67

N° 90 MARS 1968

## LES TRAITEMENTS AU DÉPART DE LA VÉGÉTATION

Si les traitements d'hiver ont essentiellement pour rôle de décaper et nettoyer les écorces dans les vergers négligés, les traitements au départ de la végétation remplacent aisément ceux-ci. Et là où les traitements d'hiver ne semblent pas nécessaires, les applications de printemps sont toujours recommandables, même en vergers bien entretenus. Cette intervention facilite par la suite le maintien d'un bon état sanitaire du verger.

Pour être plus efficaces, ces traitements seront retardés au maximum. La meilleure époque d'intervention se situe au gonflement des bourgeons mais avant que les écailles ne soient trop écartées.

Vergers de pommiers : Là où ceux-ci ont eu à subir en 1967 des attaques importantes de pucerons (Pucerons verts - pucerons lanigères...) et lorsque ces vergers sont envahis par les oeufs d'araignées rouges, appliquer un traitement aux Huiles jaunes (stade B).

Là où le problème "Oïdium" se pose avec une certaine acuité, réaliser un premier traitement au stade bouton blanc (B à C) avec un produit à base de soufre ou de Dinocap. Ajouter un produit à base de D.D.T ou d'H.C.H (pucerons anthonomes). En situation normale, il est possible d'attendre le stade C (éclatement des bourgeons). Enfin, là où l'application des Huiles jaunes n'a pas été réalisée, utiliser un Oléoparathion ou un Oléomalathion. Y ajouter un produit cuprique lors du premier traitement tavelure.

Vergers de poiriers : En cas d'infestations importantes de pucerons et d'acariens en 1967, réaliser un traitement aux Huiles jaunes dans les mêmes conditions que sur pommiers.

Dans les vergers bien entretenus, on peut attendre le stade C<sub>2</sub> (éclatement des bourgeons). Utiliser alors un Oléoparathion ou similaire auquel on ajoutera un produit cuprique qui permettra de lutter contre les premières attaques de Tavelure issues des conidies de rameaux.

## GROSEILLERS - CASSISSIERS - FRAMBOISIERS

Effectuer un traitement cuprique soigné au gonflement des bourgeons en y ajoutant éventuellement des Huiles jaunes. Lorsqu'il y a début d'apparition des jeunes feuilles, les Huiles jaunes seront remplacées par les Oléoparathions.

## POURRITURE BLANCHE DE L'AIL

Afin de lutter contre cette maladie, réaliser un enrobage des cayeux (humide de préférence) en utilisant un produit à base de Quintozène à raison de 18 gr de matière active par 10 Kg de semences ou de Dichloran (20 gr de matière active par 10 Kg de semences).

## LISTE DES PRODUITS CONSEILLÉS

La liste ci-jointe sera conservée précieusement et servira de base pour l'exécution des traitements tout au long de la saison. S'y reporter chaque fois que l'on voudra connaître la dose de matière active nécessaire pour une application donnée. Les doses indiquées à l'HI tiennent compte d'une pulvérisation de 1000 l de bouillie à l'Ha. Lorsque le débit de l'appareil est inférieur à 1000 l, il y a lieu d'augmenter en proportion la concentration de la bouillie.

## R E A B O N N E M E N T

Nous mettons en garde les personnes qui n'auraient pas renouvelé leur abonnement à ce jour. Il est devenu maintenant urgent de réaliser celui-ci faute de quoi nous nous verrons obligés d'interrompre le Service des bulletins techniques et de la revue Phytoma.

Régisseur de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 13, Grand'Place - 62 - ARRAS - C. C. P. LILLE 57-01-50.

L'Inspecteur : P. COUTURIER

Le Contrôleur : G. CONCE